

Luqsazufre

Fungicida, Acaricida



CARACTERÍSTICAS

Luqsazufre es un fungicida a base de azufre especialmente indicado contra todo tipo de oidios, con una elevada acción contra los ácaros.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

CULTIVO	AGENTE	*DOSIS %	Nº APLICACIONES (intervalo días)	VOLUMEN CALDO (l/ha)	MOMENTO APLICACIÓN
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oidio, <i>Erysipheaceae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde el desarrollo de la 5ª hoja hasta el fin de la aparición del órgano floral (BBCH 16-59)
Bulbos hortícolas	Oidio, <i>Erysipheaceae</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde que la 6ª hoja es claramente visible (>3 cm) hasta la inclinación del follaje (BBCH 16-47)
Cereales de invierno/primavera	Oidio de los cereales, <i>Blumeria graminis</i> .	0,25-0,6	1-2 (14 días)	600-833	Aplicar desde que el 1er rudo esté 1 cm por encima del rudo de macollaje hasta el fin del espigado (BBCH 31-59)
Cucurbitáceas	Oidio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	(Piel comestible y no comestible; aire libre e invernadero) Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que el 50% de los frutos muestran el color típico de la madurez completa (BBCH 13-87).
Fresal	Oidio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i> .	0,25-0,75	1-8 (10 días)	500-1000	Aplicar desde las primeras yemas florales salidas (cerradas todavía) hasta la cosecha principal (BBCH 57-87)
Frutales de hueso	<i>Podosphaera</i> spp. Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,7	1-8 (7 días)	500-1200	Aplicar desde sépalos abiertos, ápices de los pétalos visibles, flores simples con pétalos blancos o rosados hasta letargo invernal (BBCH 57-97)
Frutales de pepita	Oidio del manzano, <i>Podosphaera luscitiae</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,7	1-8 (7 días)	500-1200	Aplicar desde el estado de yema roja hasta madurez avanzada (BBCH 57-85)
Guisante proteaginoso / forrajero, guisante verde y guisante para grano	Oidio Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde que 9 o más entrenudos alargados visiblemente hasta que el 50% de las vainas están maduras, las semillas de color final, secas y duras (BBCH 39-85)
Haba para grano, haba verde, haba forrajera	<i>Erysiphe</i> spp. Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85)
Hortalizas de hoja (lechuga, espinaca)	Oidio, <i>Golovinomyces cichoracearum</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,6 (1)	1-8 (7 días)	500-666 (tractor) 500-666 (manual)	Para aplicación manual (mochila/lanza/pistola) aplicar a una dosis de 0,25-0,4%. Aplicar en BBCH 13-85
Hortalizas de del género Brassica	Oidio de las crucíferas, <i>Erysiphe cruciferarum</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,6 (1)	1-8 (7 días)	500-666 (tractor) 500-666 (manual)	Para aplicación manual (mochila/lanza/pistola) aplicar a una dosis de 0,25-0,4%. Aplicar en BBCH 13-85
Judía y haba para grano, forrajera y verde	<i>Erysiphe</i> spp. Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85)
Lúpulo	Oidio del lúpulo, <i>Podosphaera maculans</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	1000-1600	Aplicar desde el 3er par de hojas desplegadas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 13-49)
Olivio	Negrilla, fumagina, <i>Cepnodium oleophilum</i> .	0,25-0,75	1-3 (7 días)	500-1333	Aplicar desde el tamaño de los frutos alrededor del 10% de su tamaño final hasta que los frutos pierden su turgencia y empiezan a caer (BBCH 71-92)
Plantaciones tropicales y subtropicales	Oidios, <i>Erysipheaceae</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,7	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar el producto desde que los primeros pétalos son visibles hasta el fin de la caída de las hojas o el reposo invernal o vegetativo (BBCH 57-97)
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera, de mesa, brécol y patata)	Oidio de la zanahoria, <i>Erysiphe hederis</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 50% de los frutos están maduros (BBCH 13-87)
Remolacha azucarera, de mesa y forrajera	Oidio de la remolacha, <i>Erysiphe betae</i> .	0,25-1,25	1-2 (14 días)	600-1000	Aplicar desde que se finaliza la cobertura del cultivo hasta que la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha (BBCH 39-44)
Tomate	Oidio del tomate, <i>Oidium tomatosporic</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,75	1-8 (7 días)	500-1000	Aplicar desde la 3ª hoja verdadera del tallo cuando desplegada hasta que el 70% de los frutos muestran el color típico de la madurez (BBCH 13-87)
Vid	Oidio de la vid, <i>Erysiphe necator</i> . Ácaros eriófidos, <i>Eriophyidae</i> . Araña roja común, <i>Tetranychus</i> spp.	0,25-0,8	1-8 (10 días)	500-1500	Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta el comienzo de la maduración del uva (BBCH 13-81)

* Dosis máxima de producto por aplicación:

- 7,5 kg/ha en arbustos y pequeños árboles ornamentales, cucurbitáceas, fresal, guisante proteaginoso / forrajero, guisante verde, guisante para grano, bulbos hortícolas, haba para grano, haba verde, haba forrajera, judía para grano, judía verde, judía forrajera, raíces y tubérculos (excepto patata), remolacha azucarera, de mesa y forrajera, tomate.
- 5 kg/ha en cereales de invierno/primavera.
- 4 kg/ha en hortalizas de hojas del género Brassica.
- 8 kg/ha en frutales de hueso y pepita.
- 7,8 kg/ha en plantaciones tropicales y subtropicales
- 12 kg/ha en lúpulo, vid.
- 10 kg/ha en olivo.

PLAZOS DE SEGURIDAD. No procede fijar plazo de seguridad.

CONDICIONES GENERALES DE USO

Fungicida preventivo autorizado al aire libre y en invernadero. Aplicar en pulverización normal variando la dosis según temperatura ambiental, época de tratamiento, cultivo, etc. Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. En cultivos en invernadero, aplicar con mochila o lanza/pistola. No efectuar el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas. No deberán efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al del azufre. No mezclar con aceites ni productos de reacción anfótera, así como formulaciones EC. Se indicarán los riesgos de aparición de efectos no deseados en algunas variedades sensibles de frutales, fresa y vid. En algunas variedades de frutales sensibles, hacer primero una prueba aparte. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en su utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido desde su fabricación. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por incumplimiento total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.